



ES Instrucciones de uso:

Las crías huérfanas necesitan un suministro rápido de líquido/alimento para sobrevivir. Por lo tanto, debe ofrecerse un biberón con sustituto de la leche lo antes posible. El sustituto de la leche debe corresponder al tipo de animal.

El cuidado óptimo de los animales huérfanos sólo es posible con una madre sustituta. Por lo tanto, se recomienda empezar a dar el biberón y buscar una madre de acogida al mismo tiempo. Si no se encuentra una madre de acogida, un animal adulto con experiencia en el trato con crías debería apoyar la alimentación con biberón y proporcionar el comportamiento social necesario.

Nota: La alimentación con biberón suele ser la mejor manera de garantizar la supervivencia de los cachorros y gatitos. Sin embargo, para poder vivir más adelante en un entorno con otros animales adultos, los perros y los gatos deberían tener contacto con otros animales de su especie desde su nacimiento e, idealmente, crecer en una unidad familiar completa.

1. Limpieza

El biberón debe limpiarse antes y después de cada uso. Lávelo con agua caliente (máx. 60 °C) y un poco de lavavajillas y aclárelo con agua limpia para eliminar posibles restos de lavavajillas.

2. Preparación de la leche

La leche debe mezclarse fresca antes de cada toma. Tome agua hervida y siga las instrucciones del productor para preparar la leche. Para comprobar la temperatura, sostenga el biberón contra su mejilla o compruebe la temperatura en su muñeca (temperatura no superior a 36 °C).

3. Cómo alimentar

La posición para beber debe seguir la posición natural al beber de las tetas de la madre, es decir, el animalito debe estar sentado o tumbado sobre su estómago. La cabeza debe mantenerse levantada. Presione siempre una gota antes de colocar la tetina en la boca del cachorro. De este modo, se comprueba que la tetina no está bloqueada y se despierta el interés del cachorro. Una vez que la tetina esté en su boca, no debe haber más presión sobre el biberón, ya que, de lo contrario, puede producirse un atragantamiento. Moviéndolo ligeramente la tetina hacia delante y hacia atrás, puedes animar al cachorro a chupar.

4. Después de la alimentación

Después de cada comida, hay que estimular la digestión con un ligero masaje en el vientre o con suaves caricias en la región anal. Las caricias sustituyen a los lametones de la madre. El masaje abdominal no debe ser más intenso. Lo mejor es utilizar una franela suave o un pañuelo de papel para el masaje, ya que al mismo tiempo recogen la orina o las heces.

5. Frecuencia de la alimentación

Durante las dos primeras semanas, los animales recién nacidos deben ser alimentados cada 2-4 horas. Después de la segunda semana, la frecuencia puede reducirse en la mayoría de los casos a cada 4-6 horas. Nota: La frecuencia de la alimentación depende del aumento de peso diario y del estado general del animal, así como del tipo de leche utilizado. Una vez que el animal bebé pueda sentarse por sí mismo (después de unas 2-3 semanas), la leche puede ofrecerse en un cuenco. Destete y comience a alimentar con papilla o pienso para cachorros sólo a partir de las 4 semanas de edad como mínimo. Una vez más, se recomienda alimentar a las crías juntas con un cuenco para cachorros.

Un animal joven debe invertir cierto esfuerzo en alimentarse y beber. Eso ayuda a un desarrollo mental saludable en lo que respecta a la tolerancia al estrés y a la frustración.

Consejos importantes

- Todo síntoma de enfermedad, como la falta de aumento de peso o incluso la pérdida de peso, la reducción de la actividad, la diarrea, los vómitos, el aumento de la temperatura, etc., debe mostrarse al veterinario.
- Compruebe el aumento de peso de cada cachorro todos los días a una hora determinada.
- Los cachorros deben familiarizarse con el contacto corporal y los ruidos cotidianos.
- Los hermanos deben criarse juntos. Si no hay hermanos, es útil incluir en la crianza a otros animales jóvenes de aproximadamente la misma edad.
- Siempre que sea posible, los cachorros deben alcanzar el éxito por sus propios medios. Por ejemplo, no coloque al cachorro en el lugar donde duerme directamente después de alimentarse, sino que deje que se arrastre hasta allí durante una pequeña distancia. Eso ayuda al cachorro a aprender. No coloque al cachorro sobre una bolsa de agua caliente después de alimentarlo, ya que podría provocar un sobrecalentamiento.



JUNIOR

Nursing Bottle Set

EN Pet Feeding Kit

FR Set Biberon

ES Set de Biberones

#4193

EN Instructions for Use:

Orphaned baby animals need a quick supply of liquid/food to survive. Optimal care of orphaned animals is only possible with a surrogate mother. It is recommended to look for a foster mother and start bottle-feeding. If no foster mother can be found, offering a substitute for milk as soon as possible is essential. The milk substitute must be appropriate for the animal species.

Please Note: Bottle feeding is often the best way to ensure the survival of orphaned baby animals. Wild orphans should have interactions with other animals within their species quickly to ideally grow up in a family unit and independently live among others later.

1. Cleaning

Feeding bottles should be cleaned before and after each use. They should be washed in hot water with a small amount of soap and rinsed thoroughly to remove any soap residue. The bottles and accessories should be sterilized regularly in boiling water.

2. Preparing the Milk

Prepare fresh bottles before each feeding. Mix the milk substitute in the bottle according to the milk producer's specifications. Close the bottle with the lid before shaking it. Then, exchange the lid for the appropriate nipple size. Hold the bottle against your cheek for a temperature check or check the temperature on your wrist (temperature not over 36 °C).

3. How to Feed

The position for drinking should follow the natural position when drinking from the mother's nipples, which means the baby animal should sit or lie on its stomach. Its head should be upright. Always press a drop before placing the nipple into the puppy's mouth. That way, you can check that the nipple is not blocked and awaken the puppy's interest. Once the nipple is in its mouth, there should be no more pressure on the bottle. Otherwise, this can lead to choking. By slightly moving the nipple forward and backward, you can encourage the puppy to suck.

4. After Feeding

After each meal, the digestion must be stimulated with a light belly massage or soft stroking of the anal region. The stroking replaces the mother's licking. The belly massage should not be more intensive than that. A soft flannel or paper tissue is best for the massage, as they simultaneously catch urine or feces.

5. Frequency of Feeding

In the first two weeks, newborn animals should be fed every 2-4 hours. After the second week, the frequency can, in most cases, be reduced to every 4-6 hours. Please note: The feeding frequency depends on the daily weight gain, the general condition of the animal, and the type of milk used. Once the baby animal can sit independently (after 2-3 weeks), the milk can be offered in a bowl. Wean and start feeding mash or puppy feed at the earliest age of 3 weeks. Again, it is recommended that the baby animals be fed together from one puppy bowl. A young animal should invest some effort in feeding and drinking. This aids healthy mental development in terms of stress and frustration tolerance.

Important Tips

- Contact a veterinarian if the pup shows signs of illness.
 - not gaining weight or weight loss
 - lethargic, inactive
 - diarrhea, vomiting, raised temperature, and so on, should be shown to a veterinarian.
- Check each puppy's weight gain daily at a particular time.
- Puppies should be acquainted with body contact and everyday noises.
- Siblings should be raised together. If there are no siblings, it is helpful for them to be exposed to other young animals of the same age.
- Whenever possible, puppies should achieve success through their efforts. For example, please do not place the puppy on its bed directly after feeding; instead, let them crawl a little distance. That helps them learn. Do not place the puppy on a heated source after feeding, which can lead to overheating.

FR Mode d'emploi:

Les bébés animaux orphelins ont besoin d'un apport rapide de liquide/nourriture pour survivre. Il convient donc de leur offrir un biberon avec un substitut de lait dès que possible. Le substitut de lait doit correspondre au type d'animal. Les soins optimaux des animaux orphelins ne sont possibles qu'avec une mère de substitution. Il est donc recommandé de commencer l'alimentation au biberon et de chercher une mère d'accueil en même temps. Si aucune mère nourricière ne peut être trouvée, un animal adulte ayant l'habitude de s'occuper de jeunes animaux devrait soutenir l'allaitement au biberon et fournir le comportement social nécessaire.

Remarque: l'allaitement au biberon semble souvent être le meilleur moyen d'assurer la survie des chiots et des chatons. Cependant, pour pouvoir vivre plus tard dans un monde avec d'autres animaux adultes, les chiens et les chats devraient avoir des contacts avec d'autres animaux de leur espèce dès la naissance et, idéalement, grandir dans une unité familiale complète.

1. Nettoyage

Le biberon doit être nettoyé avant et après chaque utilisation. Lavez-le à l'eau chaude (max. 60 °C) avec un peu de liquide vaisselle et rincez-le à l'eau claire pour éliminer les éventuels résidus de liquide vaisselle.

2. Préparation du lait

Le lait doit être mélangé fraîchement avant chaque repas. Prenez de l'eau bouillie et suivez les instructions du producteur pour préparer le lait. Pour vérifier la température, tenez le biberon contre votre joue ou vérifiez la température sur votre poignet (température ne dépassant pas 36 °C).

3. Comment nourrir le bébé

La position pour boire doit correspondre à la position naturelle de l'animal lorsqu'il boit aux tétons de sa mère, c'est-à-dire que le bébé animal doit être assis ou couché sur le ventre. La tête doit être tenue en l'air. Pressez toujours une goutte avant de placer la tétine dans la bouche du chiot. De cette façon, vous vérifiez que la tétine n'est pas bloquée et vous éveillez l'intérêt du chiot. Une fois la tétine dans sa bouche, il ne doit plus y avoir de pression sur le biberon, sinon cela peut entraîner un étouffement. En déplaçant légèrement la tétine d'avant en arrière, vous pouvez encourager le chiot à téter.

4. Après le repas

Après chaque repas, la digestion doit être stimulée par un léger massage du ventre ou des caresses douces de la région anale. Les caresses remplacent les léchouilles de la mère. Le massage du ventre ne doit pas être plus intensif que cela. Pour le massage, il est préférable d'utiliser une flanelle douce ou un mouchoir en papier, car ils retiennent simultanément l'urine et les matières fécales.

5. Fréquence des repas

Au cours des deux premières semaines, les animaux nouveau-nés doivent être nourris toutes les 2 à 4 heures. Après la deuxième semaine, la fréquence peut dans la plupart des cas être réduite à toutes les 4-6 heures. Remarque: la fréquence de l'alimentation dépend de la prise de poids quotidienne et de l'état général de l'animal, ainsi que du type de lait utilisé. Lorsque le bébé animal peut s'asseoir tout seul (après environ 2 à 3 semaines), le lait peut être offert dans un bol. Le Sevrage et l'introduction de la pâtée ou de la nourriture pour chiots doit se faire uniquement à partir de l'âge de 4 semaines au plus tôt. Là encore, il est recommandé de nourrir les jeunes animaux ensemble dans une même gamelle. Un jeune animal doit faire des efforts pour se nourrir et boire. Cela favorise un développement mental sain en ce qui concerne la tolérance au stress et à la frustration.

Conseils importants

- Tout symptôme de maladie, tel que l'absence de prise de poids ou même la perte de poids, la réduction de l'activité, la diarrhée, les vomissements, l'augmentation de la température, etc. doit être signalé à un vétérinaire.
- Vérifiez la prise de poids de chaque chiot chaque jour à une heure précise.
- Les chiots doivent être familiarisés avec le contact corporel et les bruits de la vie quotidienne.
- Les frères et sœurs doivent être élevés ensemble. S'il n'y a pas de frères et sœurs, il est utile d'inclure dans l'éducation d'autres jeunes animaux ayant à peu près le même âge.
- Dans la mesure du possible, les chiots doivent réussir par leurs propres moyens. Par exemple, ne placez pas le chiot sur l'endroit où il dort directement après l'avoir nourri, mais laissez-le y ramper sur une petite distance. Cela aide le chiot à apprendre. Ne placez pas le chiot sur une bouillotte après l'avoir nourri, car il pourrait avoir trop chaud.

