



ES Instrucciones de uso:

Las crías huérfanas necesitan un suministro rápido de líquido/alimento para sobrevivir. Por tanto, un biberón con leche sustitutiva se le puede ofrecer tan pronto como sea posible. La leche sustitutiva tiene que coincidir con el tipo de animal. El cuidado óptimo de los animales huérfanos sólo es posible con una madre sustituta. Por lo tanto, se recomienda iniciar la alimentación con biberón y buscar una madre para la cría al mismo tiempo. Si no se encuentra una madre para la cría, un animal adulto con experiencia en el trato con animales jóvenes debe servir como apoyo a la alimentación con biberón y proporcionarles el comportamiento social necesario.

A tener en cuenta: La alimentación mediante biberón parece ser la mejor manera de asegurarse que las crías sobrevivan. Sin embargo, para convivir con otros animales adultos, los perros y los gatos deben tener contacto con otros animales de su especie desde su nacimiento y, a ser posible, crecer en una unidad familiar completa.

1. Limpieza

El biberón debe limpiarse antes y después de cada uso. Lavar con agua caliente y con un poco de jabón líquido y aclarar con agua limpia para eliminar cualquier posible residuo de jabón. Esterilice el biberón y los accesorios de forma regular en agua hirviendo.

2. Preparación de la leche

La leche debe estar recién mezclada antes de cada toma. Mezcle agua hervida y leche sustitutiva en el biberón según las especificaciones del fabricante. Cierre el biberón con la tapa antes de agitarlo. Después cambie la tapa por la tetina. Para comprobar la temperatura, acerque la botella contra la mejilla o compruebe la temperatura en su muñeca (temperatura máxima 36 °C).

3. Cómo alimentar

La postura para beber debe seguir la posición natural cuando se alimentan de las mamás de la madre, lo que significa que la cría debe estar sentada o acostada sobre su estómago. Su cabeza debe estar recta y en orientación vertical. Antes de colocar la tetina en la boca del cachorro, apriete el biberón hasta que se forme una gotita de leche en la punta de la tetina. De esa manera, se comprueba que la tetina no está bloqueada y despierta el interés del cachorro. Una vez que la tetina está en su boca, no debe haber más presión sobre la botella, de lo contrario esto puede producir asfixia. Moviéndola ligeramente la tetina hacia delante y hacia atrás, puede alentar al cachorro a succionar. py to suck.

4. Después de la alimentación

Después de cada comida, la digestión debe ser estimulada con un ligero masaje en el vientre o una suave caricia en la zona del ano. La caricia reemplaza a la madre lamiendo. El masaje del vientre no debe ser más intenso que eso. Una gasa suave o un pañuelo de papel húmedo es lo mejor para el masaje, ya que al mismo tiempo recoge orina o heces.

5. Frecuencia de alimentación

En las primeras dos semanas, los animales recién nacidos deben ser alimentados cada 2-4 horas. Después de la segunda semana, en la mayoría de los casos la frecuencia puede ser reducida a cada 4-6 horas. A tener en cuenta: La frecuencia de alimentación depende del aumento de peso diario, del estado general del animal y del tipo de leche usada. Una vez que la cría pueda sentarse por sí sola (después de aproximadamente 2-3 semanas) la leche se puede servir en un comedero. No destetar y empezar a alimentar con pienso de cachorro antes de alcanzar los 3 semanas de edad. Una vez más, se recomienda alimentar a las crías con un comedero para cachorros. Los animales jóvenes deberían interesarse por la comida y la bebida. Eso ayuda a un desarrollo mental saludable en cuanto al estrés y a la tolerancia a la frustración.

Consejos importantes

- Cada síntoma de enfermedad como la falta de aumento de peso o incluso la pérdida de peso, actividad reducida, diarrea, vómitos, temperatura elevada o demás debe indicarse a un veterinario.
- Comprobar la subida de peso del cachorro a diario a una hora fija.
- Los cachorros deben estar familiarizados con el contacto corporal y con los ruidos cotidianos.
- Los hermanos deben ser criados juntos. Si no hay hermanos, es útil incluir otros animales jóvenes de aproximadamente la misma edad en la cría.
- Siempre que sea posible, los cachorros deben avanzar por sus propios medios. Por ejemplo, no devuelva al cachorro a su cama directamente después de alimentarlo, sino permítale acercarse por sus propios medios unos pocos metros. Esto le ayuda en el aprendizaje. No ponga al cachorro encima de una botella de agua caliente después de alimentarlo puesto que puede llevar a un calentamiento excesivo.



JUNIOR

Nursing Bottle Set

EN Pet Feeding Kit

FR Set Biberon

ES Set de Biberones

#24210

EN Instruction for Use:

Orphaned baby animals need a quick supply of liquid/food to survive. Optimal care of orphaned animals is only possible with a surrogate mother. It is recommended to look for a foster mother and start bottle-feeding. If no foster mother can be found, offering a substitute for milk as soon as possible is essential. The milk substitute must be appropriate for the animal species.

Please Note: Bottle feeding is often the best way to ensure the survival of orphaned baby animals. Wild orphans should have interactions with other animals within their species quickly to ideally grow up in a family unit and independently live among others later.

1. Cleaning

Feeding bottles should be cleaned before and after each use. They should be washed in hot water with a small amount of soap and rinsed thoroughly to remove any soap residue. The bottles and accessories should be sterilized regularly in boiling water.



2. Preparing the Milk

Prepare fresh bottles before each feeding. Mix the milk substitute in the bottle according to the milk producer's specifications. Close the bottle with the lid before shaking it. Then, exchange the lid for the appropriate nipple size. Hold the bottle against your cheek for a temperature check or check the temperature on your wrist (temperature not over 36 °C).

3. How to Feed

The position for drinking should follow the natural position when drinking from the mother's nipples, which means the baby animal should sit or lie on its stomach. Its head should be upright.

Always press a drop before placing the nipple into the puppy's mouth. That way, you can check that the nipple is not blocked and awaken the puppy's interest. Once the nipple is in its mouth, there should be no more pressure on the bottle. Otherwise, this can lead to choking. By slightly moving the nipple forward and backward, you can encourage the puppy to suck.



4. After Feeding

After each meal, the digestion must be stimulated with a light belly massage or soft stroking of the anal region. The stroking replaces the mother's licking. The belly massage should not be more intensive than that. A soft flannel or paper tissue is best for the massage, as they simultaneously catch urine or feces.

5. Frequency of Feeding

In the first two weeks, newborn animals should be fed every 2–4 hours. After the second week, the frequency can, in most cases, be reduced to every 4–6 hours. Please note: The feeding frequency depends on the daily weight gain, the general condition of the animal, and the type of milk used. Once the baby animal can sit independently (after 2–3 weeks), the milk can be offered in a bowl.

Wean and start feeding mash or puppy feed at the earliest age of 3 weeks. Again, it is recommended that the baby animals be fed together from one puppy bowl.

A young animal should invest some effort in feeding and drinking. This aids healthy mental development in terms of stress and frustration tolerance.

Important Tips

- Contact a veterinarian if the pup shows signs of illness.
 1. not gaining weight or weight loss
 2. lethargic, inactive
 3. diarrhea, vomiting, raised temperature, and so on, should be shown to a veterinarian.
- Check each puppy's weight gain daily at a particular time.
- Puppies should be acquainted with body contact and everyday noises.
- Siblings should be raised together. If there are no siblings, it is helpful for them to be exposed to other young animals of the same age.
- Whenever possible, puppies should achieve success through their efforts. For example, please do not place the puppy on its bed directly after feeding; instead, let them crawl a little distance. That helps them learn. Do not place the puppy on a heated source after feeding, which can lead to overheating.

FR Mode d'emploi

Les bébés animaux orphelins ont besoin d'un apport rapide de nourriture liquide pour survivre. Pour cela, un substitut comme un biberon rempli de lait doit leur être proposé dès que possible. Le substitut du lait maternel doit correspondre au type d'animal. Il est possible de donner le meilleur soin aux petits animaux orphelins en leur apportant un substitut à leur mère. Il est donc recommandé de commencer en même temps que le biberon, la recherche d'une mère adoptive. Si la mère adoptive n'est pas trouvée, un animal adulte ayant de l'expérience des jeunes animaux peut aider à la prise du biberon et apporter le lien social nécessaire.

A noter: Le biberon semble souvent être la meilleure façon de s'assurer que les animaux bébés survivent. Afin de pouvoir vivre plus tard avec d'autres animaux adultes, les chiens et les chats doivent avoir un contact avec d'autres animaux de leur espèce dès leur naissance et idéalement grandir dans une même famille.

1. Nettoyage

Le biberon doit être nettoyé avant et après chaque utilisation. Nettoyez-le à l'eau chaude avec un peu de produit vaisselle, puis rincez à l'eau claire pour enlever les restes de détergent. Stériliser régulièrement le biberon et les accessoires dans l'eau bouillie.


2. Préparation du lait

Le lait doit être mélangé juste avant chaque repas. Mettez de l'eau bouillie et du lait en poudre dans le biberon selon les recommandations du fabricant. Fermez le biberon avec son couvercle avant de le secouer. Puis enlevez le capuchon pour la tétée. Pour contrôler la température, placez le biberon sur votre joue ou vérifiez la température sur votre poignet (température de 36 °C maximum).

3. Comment donner le biberon

La position pour boire doit suivre la position naturelle des tétines de la maman, ce qui veut dire que l'animal doit s'asseoir ou se coucher sur le ventre. Sa tête doit être en position droite.

Pressez toujours une goutte avant de placer la tétine dans la gueule du chiot. Ainsi, vous pourrez vérifier qu'elle n'est pas bouchée et qu'elle éveille l'intérêt du chiot. Une fois que la tétine est en place, ne faites pas de pression sur le biberon, cela pourrait le boucher. En faisant bouger légèrement la tétine d'avant en arrière, vous encouragez votre chiot à téter.



4. Après le repas

Après chaque repas, la digestion doit être stimulée avec un massage léger du ventre ou de la région anale. Les caresses remplacent la langue de la mère. Le massage ventral ne doit pas être aussi intensif que cela. On peut utiliser un bout de flanelle ou un mouchoir en papier, encore mieux pour le massage, qui récupère simultanément les déjections d'urine ou de selles.

5. Fréquence des repas

Pendant les deux premières semaines, les nouveaux nés doivent être nourris toutes les 2–4 heures. Après la seconde semaine, la fréquence peut dans la plupart des cas être réduite à toutes les 4–6 heures. A noter: La fréquence des repas dépend de l'augmentation quotidienne du poids, des conditions physiques générales de l'animal et du type de lait utilisé. Lorsque l'animal bébé peut s'asseoir de lui-même (au bout d'environ 2–3 semaines) le lait peut être proposé dans une écuelle.

Le sevrage et le début de la nourriture sous forme de pâtes peut commencer à partir de l'âge de 3 semaines au plus tôt. Il est recommandé de nourrir les animaux bébés ensemble autour d'une écuelle pour chiot. Un jeune animal doit fournir des efforts pour manger et boire. Cela aide à un bon développement mental autant qu'à accepter la frustration au stress.

Conseils importants

- Chaque symptôme de maladie comme absence de prise de poids ou même perte de poids, réduction de l'activité, diarrhée, vomissement, température élevée etc. doit amener à consulter un vétérinaire.
- Contrôlez chaque jour la courbe de poids du chiot à heure fixe.
- Les chiots doivent se familiariser avec le contact corporel et les bruits quotidiens.
- Les frères et sœurs doivent être élevés ensemble. Si ce n'est pas le cas, il est bon d'intégrer d'autres jeunes animaux à peu près du même âge pour l'éducation.
- Dès que possible, les chiots doivent réussir par eux-mêmes. Par exemple, ne mettez pas le chiot dans son lit directement après avoir mangé, mais laissez-le ramper sur une petite distance pour l'atteindre. Cela va l'aider à apprendre. Ne placez pas le chiot sur une bouteille d'eau chaude après son repas, cela pourrait lui donner trop chaud.

