

(FR) Lait de substitution

Aliment complémentaire pour chiots

Suggestion:

1 dose de lait pour 3 doses d'eau tiède (max 30°C). Toutes les 2-4 heures jusqu'à deux semaines, et toutes les 4-6 heures à partir de la 3e semaine. Donnez le lait au chiot tant qu'il l'accepte. Lors du passage à la nourriture solide, le lait peut être mélangé avec de la bouillie à partir de la 4e semaine. La fréquence et la quantité de nourriture dépendent du poids pris chaque jour et de l'état général.

Le lait doit être préparé juste avant chaque repas.

Composition: lait et produits laitiers, sous-produits végétaux, huiles et graisses, dextrose, dicalcium de phosphate

(NL) Melkvervanger

Aanvullend diervoeder voor puppy's

Voedingsadvies:

1 deel melk op 3 delen lauwwarm water (max 30°C). Tot en met de tweede levensweek om de 2-4 uur, vanaf de derde week om de 4-6 uur puppy melkpoeder voeren tot het verzadigingsgevoel is bereikt. Om op vaste voeding over te wennen, kan de melk meestal vanaf week vier, gemengd met puppyvoer, als pap worden verstrekt. Voederfrequentie en -hoeveelheid zijn afhankelijk van de dagelijkse gewichtstoename en de algehele gezondheidstoestand. De melk dient elke maaltijd vers te worden toe bereid.

Samenstelling: melk en zuivelproducten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, dextrose, dicalciumfosfaat

Kühl und trocken lagern. / Conservez dans un endroit frais et sec. / Droog en koel bewaren. Minstens houdbaar bis / A utiliser de préférence avant / Ten minste houdbaar tot Kenn.-Nr. der Partie / Numéro de référence du lot / Referentienummer van de partij

TRIXIE

Milchersatz Lait de substitution Melkvervanger



Für Welpen
Pour chiots
Voor puppy's
junior

#25833

(DE) Milchersatz

Ergänzungsfuttermittel für Welpen

Fütterungsempfehlung:

1 Teil Milch auf 3 Teile lauwarmes Wasser (max. 30°C). Bis zur zweiten Lebenswoche alle 2-4 Stunden, ab der dritten Woche alle 4-6 Stunden Welpenmilchlösung bis zur Sättigung. Zur Umstellung auf feste Nahrung kann die Milch meist ab der vierten Woche mit Welpenfutter vermischt als Brei gefüttert werden. Fütterungsfrequenz und -menge sind abhängig von der täglichen Gewichtszunahme und dem Allgemeinbefinden.

Die Milch muss für jede Fütterung frisch angerührt werden.

Zusammensetzung: Milch und Molkereierzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Dextrose, Dicalciumphosphat

Analytische Bestandteile / Constituants analytiques / Analytische bestanddelen:	%
Protein / Protéine / Eiwit	28,8
Fettgehalt / Teneur en matières grasses / Vetgehalte	18,9
Rohasche / Cendres brutes / Ruwe as	5,7
Rohfaser / Cellulose brute / Ruwe celstof	0,9

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / Additifs nutritionnels / Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:

Vitamin A	50.000 IE	Vitamin D ₃	2.000 IE
Vitamin E	200 mg	Vitamin B ₁	60 mg
Vitamin B ₂	20 mg	Vitamin B ₆	30 mg
Vitamin C	120 mg		

85999



#25833

250 g

TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32
24963 Tarp · GERMANY
www.trixie.de