

Выдавите каплю молочной смеси перед тем, как поместить соску в рот щенка. Таким образом, Вы убедитесь, что соска не забита, и продолжите интерес щенка. Как только соска окажется в рту, не следует больше давить на бутылочку, иначе это может привести к удушью. Слегка двигая соску вперед и назад, Вы можете побудить щенка к сосанию.

#### 4. После кормления

После каждого кормления необходимо стимулировать пищеварение с помощью легкого массажа живота или мягкого поглаживания анальной области. Поглаживание заменяет вылизывание материю. Массаж живота не должен быть более интенсивным. Для массажа лучше всего использовать мягкую фланелевую ткань или бумажную салфетку, так как они одновременно впитывают мочу и фекалии.

#### 5. Частота кормления

В первые две недели новорожденных животных следует кормить каждые 2-4 часа. После второй недели в большинстве случаев частота кормления может быть сокращена до 4-6 часов. **Обратите внимание:** частота кормления зависит от ежедневного прироста в весе и общего состояния животного, а также от типа используемого молока. Когда животное сможет самостоятельно сидеть (примерно через 2-3 недели), молоко можно предлагать в миске (например, миска для щенков TRIXIE артикул 25281/25282).

Отлучать от соски и начинать кормить поро или кормом для щенков следует не ранее чем с 4-недельного возраста. Опять же, рекомендуется кормить малышей вместе из одной миски для щенков.

Молодое животное должно прилагать определенные усилия во время кормления и питья. Это способствует здоровому психическому развитию, в том числе устойчивости к стрессам и разочарованиям.

#### Важные советы

- В случае появления таких симптомов как: отсутствие прибавки в весе или даже потеря веса, снижение активности, рвота, рвота, повышение температуры и так далее, животное нужно показать ветеринару. Проверьте прибавку в весе каждого щенка ежедневно в определенное время.
- Щенков следует приучать к телесным контактам и повседневным шумам.
- Детеныши должны воспитываться вместе с однопометниками. Если братья и сестры нет, полезно привлекать к воспитанию других молодых животных примерно того же возраста.
- При любой возможности щенки должны добиваться успехов собственными силами. Например, не кладите щенка на то место, где он спит сразу после кормления, а позовите ему проползти самому небольшое расстояние. Это помогает щенку учиться, что может привести к перегреву.

#### PT Instruções para utilização

Animais de bebés órfãos, necessitam de um fornecimento rápido de alimento para sobreviverem. Por esta razão, um biberão com leite de substituição deve ser administrado o mais rápido possível. O leite de substituição deve ser de acordo com o tipo de animal.

O cuidado ideal de animais órfãos, só é possível com a ajuda de uma mãe substituta. Por esta razão, é recomendável começar a alimentar o animal com o biberão e procurar uma mãe de substituição ao mesmo tempo. Se não for possível encontrar uma mãe de substituição, um animal adulto com experiência em lidar com cães, poderá ser uma boa alternativa, uma vez que poderá acompanhar a amamentação com o biberão e proporcionar o comportamento social necessário.

**Nota importante:** A alimentação com o biberão, parece por vezes ser a melhor forma para assegurar que os animais bebés sobrevivam. Portanto, de forma a mais tarde viver num mundo com outros animais adultos, os cães e gatos devem ter contacto com outros animais da sua espécie logo a partir da sua nascença e preferencialmente crescer numa unidade familiar completa.

#### 1. Limpesa

O biberão deve ser limpo, antes e após cada utilização. Lavar em água quente (máx. 60 °C) com um pouco de líquido de

limpeza. Enxagar bem com água limpa para remover possíveis resíduos do líquido de limpeza.

#### 2. Preparação do leite

O leite deve ser preparado fresco, antes de cada refeição. É recomendável usar água fervida e seguir as instruções do fabricante para preparar o leite. Para verificar a temperatura do leite, encostar o biberão à cara ou deitar uma gota no pulso.

#### 3. Como alimentar

A posição para mamá, deve seguir a posição natural na qual o animal mama na teta da mãe. Isto significa que o animal bebé deve sentar-se ou deitar-se sobre a barriga. A cabeça deve ser segurada numa posição ligeiramente esticada.

Antes de colocar o biberão na boca do cachorro, deve apartar a tétina até sair a primeira gota. Desta forma, poderá verificar que a tétina não está bloqueada ao mesmo tempo que despronta o interesse do cachorro. Uma vez que a tétina esteja na boca do animal, não deve exercer mais pressão sobre o biberão, senão pode levar a que o animal se engasgue. Movimentando ligeiramente a tétina para a frente e para trás, poderá encorajar o cachorro a mamar.

#### 4. Após a alimentação

Após cada refeição, a digestão tem de ser estimulada, através de uma massagem leve na barriga ou acariciando a zona anal. Estas massagens e carícias substituem o lambe da mãe. A massagem na barriga deve ser mesmo muito ligeira, simulando o lambe da mãe. Se acariciar a zona anal, deve fazê-lo com uma bola de algodão ou flanela macia, desta forma poderá apanhar qualquer urina ou fezes libertadas.

#### 5. Frequência de alimentação

Nas duas primeiras semanas, animais recém-nascidos devem ser alimentados a cada 2 a 4 horas. Após a segunda semana, a frequência pode na maioria das casas ser reduzida para cada 4 a 6 horas. **Nota importante:** A frequência da alimentação depende do aumento de peso diário e da condição geral do animal. Uma vez que o animal bebé possa sentar-se sozinho (após 2 a 3 semanas) o leite pode começar a ser oferecido numa garrafa (por exemplo TRIXIE gamelas para cachorros, artigos 25281/25282).

Desmarcar e começar a dar alimento em papa apenas a partir das 4 semanas. Mais uma vez, recomendamos alimentar os animais bebé utilizando uma gamela para cachorros.

Um animal jovem, deve investir algum esforço, para se alimentar e beber. Isto promove um desenvolvimento mental saudável, no que diz respeito à tolerância de stress e frustração.

#### Conselhos importantes

- Qualquer sintoma de doença, como diarreia, vómitos, temperatura elevada e outros, devem ser verificados por um veterinário.
- Verificar diariamente o aumento de peso do cachorro.
- Os cachorros devem ser habituados ao contacto corporal e ruidos quotidiano.
- Os irmãos devem ser criados juntos. Se não houver irmãos, é aconselhável incluir outros animais jovens, mais ou menos da mesma idade, na criação.
- Sempre que possível, os cachorros devem obter os seus sucessos com os seus próprios esforços. Por exemplo, não colocar o cachorro na botija de azeitamento directamente após ter mamado, mas permitir que este se movimente até lá, numa distância curta. Isto ajuda o cachorro a aprender.

#### PT Instruções para utilização

Animais de bebés órfãos, necessitam de um fornecimento rápido de alimento para sobreviverem. Por esta razão, um biberão com leite de substituição deve ser administrado o mais rápido possível. O leite de substituição deve ser de acordo com o tipo de animal.

O cuidado ideal de animais órfãos, só é possível com a ajuda de uma mãe substituta. Por esta razão, é recomendável começar a alimentar o animal com o biberão e procurar uma mãe de substituição ao mesmo tempo. Se não for possível encontrar uma mãe de substituição, um animal adulto com experiência em lidar com cães, poderá ser uma boa alternativa, uma vez que poderá acompanhar a amamentação com o biberão e proporcionar o comportamento social necessário.

**Nota importante:** A alimentação com o biberão, parece por vezes ser a melhor forma para assegurar que os animais bebés sobrevivam. Portanto, de forma a mais tarde viver num mundo com outros animais adultos, os cães e gatos devem ter contacto com outros animais da sua espécie logo a partir da sua nascença e preferencialmente crescer numa unidade familiar completa.

#### 1. Limpesa

O biberão deve ser limpo, antes e após cada utilização. Lavar em água quente (máx. 60 °C) com um pouco de líquido de

limpeza. Enxagar bem com água limpa para remover possíveis resíduos do líquido de limpeza.

#### 2. Czyszczenie

Butelkę do karmienia należy czyszczyć przed i po każdym użyciu. Umyć w gorącej wodzie (maks. 60°C) z odrobiną płynu do mycia naczyń i wypłukać w czystej wodzie, aby usunąć ewentualne pozostałości płynu do mycia naczyń.

#### 3. Przygotowywanie mleka

Mleko należy miesiąc na świeże przed każdym karmieniem. Weź przygotowaną wodę i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby przygotować mleko. Aby sprawdzić temperaturę, przyłożź butelkę do policzka lub sprawdź temperaturę na nadgarstku (temperatura nie wyższa niż 36°C).

#### 4. Jak karmić

Pozycja karmienia powinna być zgodna z naturalną pozycją, tzn. zwierzę powinno siedzieć lub leżeć na brzuchu. Głowa powinna być podniesiona.

Zawsze wyciągnij kropelę mleka przed włożeniem smocza do buzi szczeniaka. W ten sposób sprawdzisz, czy smoczek nie jest zablokowany i rozbudzi zainteresowanie szczeniaka. Gdy smoczek znajdzie się w buzi, nie należy już naciągać na butelkę, w przeciwnym razie może to doprowadzić do zakrzepnięcia. Lekko przesuwając smoczek do przodu i do tyłu, możesz zacząć szczeniaka do ssania.

#### 5. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 6. Po nakrmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 7. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 8. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 9. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 10. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 11. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 12. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 13. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 14. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 15. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 16. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 17. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 18. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 19. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 20. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 21. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 22. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 23. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 24. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 25. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu. Główkiem zazwyczaj kontrolujesz, że żerująca szczeniak zatrzymał się na brzuchu i aktywnie aktywuje się.

#### 26. Po karmieniu

Po każdym posiłku należy pobudzić trawienie lekkim masażem brzucha lub delikatnym głaskaniem okolic odbytu.

